

Anmeldecheckliste

für Rettungsdienste, Integrierte Leitstellen und Kliniken

1. Geschlecht

weiblich Schwangerschaft männlich

2. Patientendaten

Name Geburtsdatum, ggf. Alter geschätzt in Monaten/Jahren
 Neugeborenes (bis 1 Monat) Säugling (1 Monat bis 1 Jahr)
 Kleinkind (1 bis 6. Jahre) Schulkind (7 bis 12 Jahre)
 Jugendlicher (12 bis 16 Jahre) Erwachsener

3. Verdacht/gesicherte Erkrankung/Verletzung/Ereignisschilderung

4. Bewusstsein

ansprechbar somnolent bewusstlos

5. Kreislauf

katecholaminpflichtig instabil
 Reanimation stabil

6. Atmung

Spontanatmung beatmet über
 Tubus alternativer Atemweg
 NIV Maskenbeatmung

7. Was soll alarmiert werden? Was wird benötigt?

Schockraum: **Trauma A / Trauma B (Tabelle)**
 Schockraum: **NichtTrauma (Tabelle!)**
 STEMI: **Uhrzeit Diagnose, Telemetrie, Arzt-Arzt-Gespräch**
 STROKE: **Uhrzeit Symptombeginn, ggf. Arzt-Arzt-Gespräch**
 SEPSIS: **Auffälligkeiten von qSOFA**
 Geburtshilfe: **Schwangerschaftswoche, Wehentätigkeit –Abstand, Fruchtblase, vaginale Blutung, ggf. Arzt-Arzt-Gespräch**
 Verbrennung: **Verbrennungsoberfläche + Grad**
 Psychiatrie: **Selbst- Fremdgefährdung, Polizei, Wohnort des Patienten, Sorgeberechtigter**

8. Besonderheiten

Antikoagulantien
 Ansteckende Erkrankungen → Isolierung
 mehrere Verletzte/Erkrankte (MAN/MANV/MANE/REBEL/Lbel)
 Sonstiges/Besonderheiten

9. Eintreffzeit

konkrete Uhrzeit

Alarmierungskriterien für Schockraum

Trauma A (Verletzungen)	Trauma B (Kriterien)	Nicht Trauma
<ul style="list-style-type: none"> • systolischer Blutdruck unter 90 mmHg (altersadaptiert bei Kindern) nach Trauma • penetrierende Verletzungen d. Rumpf-Hals-Region • Schussverletzungen d. Rumpf-Hals-Region • GCS unter 9 nach Trauma • Atemstörungen, Intubationspflicht nach Trauma • Frakturen von mehr als 2 proximalen Knochen • instabiler Thorax • Beckenfrakturen • Amputationsverletzung proximal der Hände/Füße • Querschnittsverletzung • offene Schädelverletzungen • Verbrennungen > 20% und Grad \geq 2b <p><u>Sonstige Indikationen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Crush-Syndrom (Explosionsverletzung / Verschüttung / Überrolltrauma) • u.w. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sturz aus über 3 Metern Höhe • Verkehrsunfall (VU) mit <ul style="list-style-type: none"> - Frontalaufprall mit Intrusion von mehr als 50–75 cm - einer Geschwindigkeitsveränderung von delta > 30 km/h - Fußgänger-Zweiradkollision - Tod eines Insassen - Ejektion eines Insassen 	<ul style="list-style-type: none"> • Anhaltender Schockzustand mit (RR <80 mmHg und HF >100/min) • Vital bedrohliche Gastro-Intestinale- Blutung • Akut anhaltende Atemnot (AF >25/min u. SO₂ <90%) • Beatmungspflichtige internistische Krankheitsbilder • Lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen • Reanimation, Z.n. • Status epilepticus • Anhaltende Bewusstlosigkeit (GCS < 9) • Neurologische Symptomatik mit (intensivpflichtiger) Kreislauf- u. Atmungsinstabilität • Septische Patienten mit (intensivpflichtiger) Kreislauf- u. Atmungsinstabilität • vom Notarzt lebensbedrohlich eingestufte internistische Krankheitsbilder (z.B. Intoxikationen, Hypothermie, Hyperthermie etc.) • STEMI / STROKE gesonderte Anmeldung! <p><u>Sonstige Indikationen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • V.a. rupturiertes thorakales oder abdominelles Aortenaneurysma • Akutes bretthartes Abdomen • u.w.